

1. Наименование лекарственного препарата

Мазь фурацилиновая 0,2%

1.1. Дозировка

0,2%

1.2. Лекарственная форма

Мазь

2. Качественный и количественный состав

100 г мази содержит:

активное вещество – 0,2 г нитрофурала,

вспомогательное вещество – 99,8 г вазелина.

3. Описание лекарственной формы

Мазь желтого цвета.

4. Клинические данные

4.1. Показания к применению

- гнойные раны,
- пролежни,
- язвы,
- ожоги II и III степени,
- анаэробная инфекция раневой поверхности

4.2. Режим дозирования и способ применения

Препарат назначают для местного, наружного применения. Мазь наносят тонким слоем или под согревающую повязку 1-3 раза в день на пораженные участки кожи в течение 2-3 дней.

4.3. Противопоказания

- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата,
- аллергические дерматозы.

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

При назначении беременным женщинам, женщинам в период лактации и детям рекомендуется учитывать возможное соотношение риска и пользы от применения данного лекарственного средства.

4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Клинически значимое взаимодействие с какими-либо другими лекарствами не описано.

4.6. Фертильность, беременность и лактация

Перед применением препарата во время беременности и в период грудного вскармливания необходимо обратиться к врачу.

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Препарат не оказывает отрицательного влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций.

4.8. Нежелательные реакции

Возможно: местные аллергические реакции, дерматиты.

4.9. Передозировка

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна.

5. Фармакологические свойства

Антисептическое и дезинфицирующее средство

Код АТХ - D08AF01

5.1. Фармакодинамические свойства

Противомикробное, противовоспалительное средство, производное нитрофурана. Бактериальные флавопротеины, восстанавливая 5-нитрогруппу, образуют высокореактивные аминокислотные производные, способные вызывать конформационные изменения белков (в т.ч. рибосомальных) и др. макромолекул, приводя к гибели бактерий. Активен в отношении грамположительных бактерий: *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Bacillus anthracis*; грамотрицательных бактерий: *Escherichia coli*, *Shigella* spp., *Salmonella* spp. (в т.ч. *Salmonella paratyphi*). Устойчивость развивается медленно и не достигает высокой степени.

5.2. Фармакокинетические свойства

Не изучено.

6. Фармацевтические свойства

6.1. Перечень вспомогательных веществ

вазелин

6.2. Несовместимость

Не описано.

6.3. Срок годности

2 года.

6.4. Особые меры предосторожности при хранении

Хранить при температуре не выше 25°C, в недоступном для детей месте.

6.5. Характер и содержание первичной упаковки

По 25г мази в алюминиевой тубе.

6.6. Особые меры предосторожности при уничтожении использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата или работы с ним

Нет особых требований к утилизации.

7. Держатель Регистрационного Удостоверения

ООО “Эско-Фарм”

Республика Армения, Ереван 0079, ул. Микояна 13

Тел.: (+37410) 673903

E-mail: farm-esco@mail.ru

8. Номер регистрационного удостоверения

18800

9. Дата подтверждения регистрации

04.06.2018

10. Дата пересмотра текста

Сентябрь, 2023г.