

1. Название лекарства

Линимент Вишневого

2. Состав

100 г линимент содержит 3.0 г березового дегтя, 3.0 г ксероформа.

Вспомогательные вещества – 5.0 г аэросил, 89.0 г касторовое масло.

3. Лекарственная форма

Линимент

4. Описание

Линимент от желтоватого до бурого цвета, со специфическим запахом.

5. Фармакотерапевтическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства

Код АТХ - отсутствует

6. Терапевтические показания

6.1 Показания к применению

Неинфицированные послеоперационные и посттравматические раны кожи и мягких тканей.

6.2 Способы применения и режим дозирования

Применяют наружно у взрослых. Наносят 2–3 раза в сутки тонким слоем на пораженные участки кожи или накладывают на протяжении срока, определенного тяжестью протекания процесса и переносимостью препарата.

В случае применения под повязкой перед ее наложением рану очищают от некротических тканей, раскрывают пузыри, промывают антисептическим раствором. Накладывают повязку в 5–6 слоев марли с препаратом, фиксируют. Повязку меняют 1 раз на 2–3 дня. Курс лечения составляет 10–12 суток.

6.3 Противопоказания

Гиперчувствительность, острые гнойные заболевания кожи и мягких тканей (в т.ч. абсцедирующий фурункул, карбункул, флегмона, абсцесс, гидраденит, лимфаденит, нагноившаяся атерома, липома, парапроктит, эмпиема плевры).

6.4 Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не описано.

6.5 Побочное действие

При продолжительном применении возможно раздражение кожи в виде покраснения, отека, зуда на месте нанесения лекарственного средства.

6.6 Особые указания

Линимент предназначен только для наружного применения. Не допускать попадания препарата на слизистые оболочки, особенно в глаза! В случае попадания промыть большим количеством воды.

Руки после нанесения линимента необходимо тщательно вымыть для предотвращения попадания остатков препарата в глаза, нос, рот.

Деготь берёзовый, входящий в состав линимента бальзамического, способен повышать чувствительность к солнечному свету, поэтому следует избегать пребывания на солнце во время лечения препаратом. Следует с осторожностью применять препарат лицам с повышенной чувствительностью к фенолу и его производным.

Дети: Данные относительно безопасности и эффективности применения отсутствуют.

6.7 Беременность и лактация

Применение при беременности и лактации допускается только по назначению врача, с учетом соотношения пользы для матери и потенциального риска для плода/ребенка.

6.8 Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами

Не описано.

6.9. Передозировка

При длительном применении возможны проявления местной аллергической реакции (высыпания, зуд), что требует проведения десенсибилизирующей терапии.

7. Фармакологическое действие

7.1 Фармакодинамика

Лекарственное средство обладает антисептическими свойствами. Оказывает слабое раздражающее действие на рецепторы тканей, способствует ускорению процесса регенерации, улучшая ее у эпидермиса, нормализуя кровообращение тканей, усиливая процессы ороговения.

7.2 Фармакокинетика

Не изучена.

8. Фармацевтические свойства

8.1 Вспомогательные вещества

Аэросил, касторовое масло.

8.2 Несовместимость

Не описано.

8.3 Срок годности

5 лет. Не использовать после окончания срока годности.

8.4 Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C, в недоступном для детей месте.

8.5 Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению как средство безрецептурного отпуска.

8.6 Форма выпуска и упаковка

По 25г линимента в алюминиевой тубе, помещенной в пачку из картона вместе с инструкцией по применению.

9. Название и адрес производителя

ООО “Эско-Фарм”

Республика Армения, Ереван 0079, ул. Микояна 13

Тел.: (+37410) 673903

E-mail: farm-esco@mail.ru

10. Владелец Регистрационного Удостоверения

ООО “Эско-Фарм”

Республика Армения, Ереван 0079, ул. Микояна 13

Тел.: (+37410) 673903

E-mail: farm-esco@mail.ru